



CUARTA ENCUESTA NACIONAL EN HOGARES SOBRE CONSUMO DE DROGAS.



Características del escenario



• *Cuarta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Drogas**

• *Nov-Dic 2006*

(JND – ONUDD-OEA)

POBLACIÓN OBJETIVO



Población de 12 a 65 años
residentes en ciudades de
10.000 habitantes y más.

Instrumento: Encuesta cara a cara

Muestra: Por conglomerados polietápica sin reposición.

Tamaño de la muestra: 7000 encuestas efectivas.



Objetivos

- ❑ Estudiar la magnitud y patrones del consumo de drogas con instrumentos y parámetros comparables entre los países integrantes del Proyecto (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay) .
- ❑ Explorar posibles asociaciones entre las conductas de consumo y variables sociodemográficas básicas.
- ❑ Explorar posibles asociaciones entre el consumo de sustancias y determinados factores de riesgo y protección.
- ❑ Niveles de Dependencia y Abuso para las principales sustancias.
- ❑ Representaciones sociales, oferta y percepción del riesgo.
- ❑ Medir consumo en población de alto riesgo (Jóvenes que ni trabajan ni estudian).


INDICADORES UTILIZADOS.

- **PREVALENCIA DE VIDA:** Mide el consumo alguna vez en la vida de la sustancia indagada
- **PREVALENCIA ÚLTIMOS 12 MESES:** Mide el consumo reciente. Incluye los consumidores ocasionales y frecuentes.
- **PREVALENCIA ÚLTIMOS 30 DÍAS:** Mide el consumo habitual.
- **INCIDENCIA:** Mide el porcentaje de personas que probaron por primera vez en el último año la sustancia indagada.
- **DEPENDENCIA:** Serie de Indicadores resumidos en un INDICE que mide los síntomas de dependencia (física o psicológica) de la persona a la sustancia indagada.
- **ABUSO:** Consumo en una sola ingesta sobre el nivel de intoxicación.

ALCOHOL: La droga mas consumida





ALCOHOL: La droga mas consumida



Casi el 30% de los consumidores de alcohol en los últimos 12 meses presentan un consumo problemático (230.000 personas)

TABACO: Alto consumo con tendencia a su disminución.



TABACO: Alto consumo con tendencia a su disminución.

Tabla - Frecuencia de consumo

Tipo de consumo	Porcentaje
Ininterrumpido	41.2
Por largos períodos	27.4
Ocasional	31.4
TOTAL	100

Base: Consumieron tabaco alguna vez en la vida

Tabla - Intensidad de Consumo

Consumo diario	Porcentaje
Menos de 10	51.0
Entre 10 y 20	34.6
Entre 20 y 40	10.1
Más de 40	4.4
TOTAL	100


Base: Fumadores últimos 30 días

Promedio diario: 14.32

7 de cada 10 personas que experimentaron con tabaco, continuaron su consumo.



Uso de tranquilizantes y antidepresivos: la automedicación.

El 22% de la población estudiada consumió tranquilizantes alguna vez en la vida .Un 7.04% para igual indicador consumió antidepresivos.



52000 personas han consumido en forma indebida alguna vez en la vida este tipo de medicamentos.

Marihuana: la droga ilegal mas consumida




Marihuana: la droga ilegal mas consumida


De cada 10 personas que experimentaron con Marihuana, cuatro la siguieron consumiendo.

Dependencia según frecuencia de consumo

Frecuencia	%
Algunas veces en el año	29.8
Algunas veces mensualmente	34.8
Algunas veces semanalmente	56.9
Diariamente	57.9





General: 33.5%



28.000 personas presentan algún signo de dependencia a la misma

Cocaína: un consumo experimental en aumento.




Cocaína: un consumo experimental en aumento.

El 30% de los consumidores del último año presentan algún signo de dependencia a la misma.

Con qué frecuencia ha usado cocaína ?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Una sola vez	4652	20,1	20,1	20,1
	Algunas veces durante los últimos 12 meses	11587	50,0	50,0	70,1
	Algunas veces mensualmente	5977	25,8	25,8	95,9
	Algunas veces semanalmente	689	3,0	3,0	98,9
	Diariamente	251	1,1	1,1	100,0
	Total	23156	100,0	100,0	

Pasta base: un consumo de baja magnitud pero alto impacto.



8% en zonas periféricas y alta vulnerabilidad social

Pasta base: un consumo de baja magnitud pero alta visibilidad.

- El 57% de los consumidores de los últimos 12 meses presenta algún signo de dependencia.
- Tres de cada cuatro consumidores son hombres.
- La edad promedio de inicio es de 20 años. El 60% de los mismos ha consumido inhalantes previamente.

Otras drogas: un consumo experimental y de baja magnitud.

Sustancia	Prevalencia de vida
Estimulantes sin prescripción médica	0.7
Solventes e inhalantes	0.6
Extasis	0.7
Alucinógenos	1.2
Otras drogas (Opio, morfina, Crack, hachis)	<0.2

PRINCIPALES RESULTADOS PRELIMINARES

- Casi 13 de cada 100 uruguayos consumieron alguna vez en la vida alguna sustancia ilegal. La mitad de ellos en el último año.
- Son 16000 los nuevos consumidores de Marihuana el último año, 4800 de Cocaína y 1600 de Pasta base.

Sustancia	INCIDENCIA (%)	DEPENDENCIA (%)
Alcohol	1.9	30
Tabaco	1.8	70
Marihuana	1.0	33.0
Cocaína	0.3	30
Pasta Base	0.1	57

PRINCIPALES RESULTADOS PRELIMINARES

Usuarios con signos de dependencia	Datos expandidos
ALCOHOL (DEP + ABUSO)	230.000
TABACO (FUMADOR INTENSO)	73.000
PSICOFÁRMACOS SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA	52.000
MARIHUANA	28000
COCAINA	6500
PASTA BASE	3000

Por cada usuario con uso problemático de pasta base hay 100 con uso problemático de alcohol.

PRINCIPALES RESULTADOS PRELIMINARES

Percepción de riesgo de consumo de ...	Ningún riesgo	Riesgo leve / moderado	Gran riesgo	No sabe
Consumir cigarrillos frecuentemente	0.9	19.8	74.6	4.6
Consumir alcohol frecuentemente	1.2	20.1	74.3	4.3
Consumir tranquilizantes /antidepresivos sin prescripción	0.7	14.6	76.2	8.6
Consumir marihuana alguna vez	6.4	32.3	52.2	9.0
Consumir marihuana frecuentemente	1.5	14.5	77.0	7.0
Consumir cocaína alguna vez	1.5	18.4	72.4	7.8
Consumir cocaína frecuentemente	0.2	3.9	89.8	6.1
Consumir pasta base alguna vez	0.4	7.2	85.8	6.7
Consumir pasta base frecuentemente	0.1	2.0	92.3	5.5

PRINCIPALES RESULTADOS PRELIMINARES

Consumidores potenciales

- Un 17% de los encuestados manifiesta haber sentido curiosidad por probar alguna droga ilegal.
- 7 de cada 100 encuestados manifiesta que probaría si tuviera la oportunidad.

PRINCIPALES RESULTADOS PRELIMINARES

- El consumo de drogas en Uruguay es, en términos generales, mayor en el sexo masculino, en Montevideo y en las personas entre 19 y 34 años. La excepción la constituye el consumo de Tranquilizantes y Antidepresivos donde el consumo de los mismos alguna vez en la vida de las mujeres duplica al de los hombres y no presenta diferencias significativas por área geográfica. .
- Respecto a la tendencia del consumo, se mantienen sin cambios significativos a nivel general las tasas de Alcohol , Tabaco y Tranquilizantes y Antidepresivos. Con respecto al Tabaco sin embargo debemos destacar que en el segmento etareo de menor edad (12 a 17) se presenta una leve disminución respecto al 2001.
- En cuanto a las drogas ilegales, se encuentra un aumento significativo en las prevalencias de consumo de Marihuana y Cocaína. Se destaca también la aparición de una nueva sustancia (Pasta base) que no registraba consumo en el anterior estudio del 2001.
- Baja percepción del riesgo del consumo continuo de alcohol.

PRINCIPALES RESULTADOS PRELIMINARES

Percepción del consumo de su entorno

Sustancia	En la casa	Amigos cercanos	Compañeros de trabajo/estudio
Cigarrillos diariamente	40.6	S.D	S.D
Alcohol diariamente	15.2	S.D	S.D
Marihuana	4.9	16.5	11.0
Cocaína	1.8	6.0	3.6
Pasta Base.	1.8	4.1	2.1

El 80% cree que el consumo de drogas ha aumentado en la ciudad y el 50% en su barrio.

El 60% afirma que en su barrio se venden drogas.

Fuente: Cuarta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Hogares- Noviembre 2006

PRINCIPALES RESULTADOS PRELIMINARES

Preocupación por parte del estado

Ud. cree que el problema de drogas se encuentra entre las preocupaciones centrales de...	SI	NO	NS/NC
Las autoridades de la comuna?	36.4	49.8	13.7
Parlamentarios (senadores,diputados)?	36.6	49.5	13.9
Las autoridades del gobierno?	47.8	40.3	11.9

PRINCIPALES RESULTADOS PRELIMINARES

El 41.5% de los encuestados declara que sabe de la existencia de un organismo gubernamental para la prevención sobre el consumo de drogas.

Cual es ese organismo?	% de respuestas sobre el total de la muestra.
Policia /Ministerio del Interior.	2.7
Ministerio de Defensa	0.2
Ministerio de Salud pública	3.7
INAU	1.8
Ministerio de Justicia / Poder Judicial	0.1
JND/SND	10.8
Portal Amarillo	1.8
Ministerio de Educación y Cultura	0.2
Juntas locales / CCZ	0.1
Intendencias	0.3
Otros	1.6
No sabe / no recuerda	17.9

Fuente: Cuarta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Hogares- Noviembre 2006

PRINCIPALES RESULTADOS PRELIMINARES

El 41.4% de los encuestados declara que sabe de la existencia de un organismo gubernamental para el tratamiento de las adicciones a las drogas. .

Cual es ese organismo?	% de respuestas sobre total de la muestra
Salud Pública	7.5
Hospital de Clínicas	0.9
Hospital Maciel	0.8
Hospital Vilardebó	1.5
INAU	2.1
Portal Amarillo	7.0
Otros	2.4
No sabe /No recuerda.	19.2

PRINCIPALES RESULTADOS PRELIMINARES

Para solucionar problemas del consumo de drogas.	Porcentaje
Aumentar el castigo a los traficantes	49.9
Campañas de prevención en colegios / liceos	38.1
Campaña de prevención en medios masivos de com.	23.9
Castigo a los consumidores.	19.8
Programas de prevención en familias	26.1
Informar de los riesgos para un consumo responsable	22.4
Aumentar los recursos policiales	21
Aumentar los recursos para prevención.	18
Destinar fondos para tratamiento de adictos.	15.4
Legalizar el consumo	13.4

PRINCIPALES RESULTADOS PRELIMINARES

- 40.000 personas declaran que han buscado ayuda profesional por adicción a alguna droga. La cuarta parte de ellos lo ha hecho en Alcoholicos Anónimos.
- La mitad continúa tratamiento.
- 66.000 personas tienen o han tenido algún familiar en tratamiento por adicción a alguna droga.

Muchas gracias!

www.infodrogas.gub.uy



Fuente: Cuarta Encuesta Nacional en Hogares sobre Consumo de Hogares- Noviembre 2006